

ELENCO DEL MATERIALE PRESENTE NELLE CASSETTE/PACCO DI REINTEGRO CONTENUTO BASE (FINO A 4 DIPENDENTI)

San Marino 28 agosto 2006, Prot. N° 7330/15
DIPARTIMENTO DI SALUTE PUBBLICA

Il materiale contenuto nel pacchetto di medicazione deve essere conservato in buono stato di pulizia, ripristinato dopo ogni utilizzo, facilmente visibile e accessibile a chiunque. I presidi devono essere controllati periodicamente e rinnovati qualora risultino scaduti.

MATERIALE	UTILIZZO
Guanti sterili monouso in lattice o materiale equivalente **PZ 2**	Vanno indossati immediatamente prima di prestare soccorso in tutti i casi di infortunio. I guanti devono essere rimossi subito dopo l'uso (e mai riutilizzati) e prima di toccare oggetti non contaminati e superfici ambientali. Nello sfilare i guanti porre attenzione a non contaminarsi. Dopo la loro rimozione effettuare possibilmente il lavaggio delle mani, poiché possono presentare difetti invisibili e lacerarsi durante l'uso, con conseguente contaminazione delle mani.
Boccaglio per respirazione bocca a bocca monouso a flusso unidirezionale **PZ 1**	Si utilizza nella respirazione bocca a bocca per evitare il contatto diretto con la bocca dell'infortunato (rischio significativo di trasmissione di infezioni solo in presenza di sangue); permette l'entrata dell'aria soffiata anche attraverso il naso; consente di utilizzare entrambe le mani per conservare la corretta iperestensione della testa e per tenere in posizione la mascherina. Va utilizzata da personale adeguatamente formato in tecniche di Primo Soccorso.
Visiera paraschizzi **PZ 1**	Va indossata immediatamente prima di prestare soccorso nei casi di infortunio con pericolo di schizzi di sangue come nei casi di ferite gravi con emorragia arteriosa.
Acqua ossigenata **PZ 1**	Adatta per detergere ferite lievi; da non utilizzare invece su ferite con emorragia o su ferite penetranti. Va utilizzata versandola a getto direttamente sulla ferita; allontanare quindi la schiuma con una garza sterile (dal centro alla periferia).
Clorossidante elettrolitico al 5% (Amuchina) **PZ 1 (ml 200) oppure PZ 5 salviette**	Si utilizza su ferite lievi, contusioni aperte o punture d'insetto, non è adatto in caso di amputazioni o ferite emorragiche; impedisce la penetrazione di batteri e virus. Applicare con una garza sterile attorno alla ferita e non sopra (dal centro alla periferia).
Compresse di garza sterili **PZ 2 (cm 18X40)** **PZ 3 (cm 10x10)**	Indicate per la pulizia, la disinfezione e la protezione delle ferite. Per la protezione delle ferite appoggiare la garza ripiegata sopra la ferita e fissare con il cerotto o una benda. Nell'impiego di questi presidi va mantenuta la sterilità, quindi per la loro manipolazione è bene usare le pinze sterili monouso. Una volta aperta la busta le garze perdono la loro sterilità; quindi non utilizzare le garze residue per altre medicazioni.
Cotone idrofilo **PZ 1 (gr 5)**	Il cotone va utilizzato solo come materiale assorbente in caso di perdita abbondante di sangue, unitamente alla garza. E' importante non usarlo direttamente sulle ferite perché può lasciare residui di filamento di cotone. E' indicato per: a) ricavare tamponcini da medicazione da imbibire con il disinfettante; b) creare ulteriore protezione esterna alle medicazioni già eseguite con garze e cerotto; c) ammorbidire lo steccaggio bendato di fratture e contusioni; d) realizzare tamponi nasali estemporanei in caso di semplice epistassi; e) in caso di congelamento.
Rete elastica **PZ 1**	In caso di ferite, si utilizza a seguito della medicazione per fissare la stessa.

Cerotti pronti per l'uso di varie misure **PZ 1 (conf. 20)** **PZ 1 (conf. 10 assortiti)**	Per cerotti medicati si intendono i cerottini di uso comune, che si trovano già confezionati sterilmente, in diverse misure. Sono molto utili, di facile e diretta applicazione su ferite e abrasioni. E' importante che l'applicazione avvenga su cute asciutta dopo aver pulito e disinfettato la ferita e l'area circostante.
Rotoli di benda orlata **PZ 1 (cm 10 X m 3,5)** **PZ 1 (cm 7 X m 3,5)** **PZ 1 (cm 5 X m 3,5)**	Particolare tipo di benda abbastanza resistente, che non si sfilaccia e che presenta una certa versatilità di impiego. E' indicata per: a) il bendaggio di una medicazione complessa; b) eseguire il bendaggio compressivo in caso di emorragia persistente; c) praticare immobilizzazioni estemporanee di un arto traumatizzato, avvolgendola intorno all'arto stesso e alla stecca per fratture che lo rettilineizza.
Pinzetta da medicazione sterile monouso **PZ 1**	Indicata per la rimozione di piccoli corpi estranei ed ogni qualvolta si deve operare con materiale sterile. Per mantenere la sterilità della pinza occorre prestare molta attenzione all'apertura della confezione, aprendola dalla parte in cui la pinza è saldata. La parte che si può toccare con le mani è quella centrale o sagomata.
Forbici **PZ 1**	E' importante che siano del tipo "taglia abiti" e non forbicine. Si utilizzano per tagliare cerotti, bende, rete elastica, per aprire la confezione di soluzione fisiologica e per tagliare i vestiti, nei traumi (per verificare la presenza di ferite sotto i vestiti), nelle ustioni da sostanze chimiche (per eliminare velocemente i vestiti impregnati).
Rocchetto cerotto **PZ 1 (cm 2,5 X m 5)**	Il cerotto adesivo può essere usato per fermare le garze di una medicazione o le estremità di un bendaggio e non va mai applicato direttamente su di una ferita. Evitare di fare un giro completo del cerotto intorno all'arto (per non bloccare la circolazione).
Laccio emostatico **PZ 1**	E' importante prevedere un laccio emostatico "arterioso", utilizzato per il controllo delle emorragie di un arto. Agisce mediante l'applicazione di una costrizione a tutti i vasi arteriosi che irrorano l'arto interessato nonché ai vasi venosi che provengono da esso. Va utilizzato da personale adeguatamente formato solo in casi estremi perché, arrestando completamente la circolazione dell'arto, questo va in sofferenza, con il rischio di cancrena. Stringere il laccio fino all'arresto del sanguinamento ma non oltre, annotare l'ora di applicazione. Rimuovere o allentare la fascia è pericoloso (perché si possono liberare in circolo coaguli, con conseguente rischio di ostruzione di vasi sanguigni). L'applicazione del laccio va fatta a monte della ferita (non a contatto con la ferita) e più vicino possibile alla radice dell'arto; mai sotto il ginocchio o il gomito. L'acquisizione di queste tecniche richiede formazione specifica e esercitazioni pratiche ripetute nel tempo.
Ghiaccio pronto all'uso **PZ 1**	E' indicato in caso di contusione, distorsione, amputazione, puntura d'insetto. Attivare dando un colpo secco e deciso con la mano chiusa alla busta per causare la rottura del sacchetto d'acqua contenuto all'interno, agitare la confezione per avere un freddo immediato. Interporre una garza tra la busta e la parte interessata, all'occorrenza fissare la confezione con una fascia. Non porre la parte amputata a diretto contatto con il ghiaccio.
Coperta isotermica monouso **PZ 1**	E' indicato per coprire il traumatizzato in attesa dei soccorso sanitari. Costituisce un presidio utile al fine di prevenire l'ipotermia nel paziente soccorso, particolarmente in condizioni ambientali sfavorevoli.
Termometro digitale **PZ 1**	Per misurare la temperatura corporea sotto-ascellare. Dopo ogni utilizzo, va lavato con acqua e sapone e disinfettato.

L'ANTINCENDIO SAMMARINESE
It's safety.
Strada Auloceto 1
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino
Codice Operatore Economico SM19210
0549 906064 0549 906074
info@antincendiorsm.com
antincendiorsm@pec.it
www.antincendiorsm.com